

علایم ترومایی سر

تعریف: آسیب به سر عبارت است از عارضه‌ای که به دنبال تصادفات، زمین خوردن و... اتفاق می‌افتد و باعث کاهش هوشیاری، خونریزی مغزی و..... می‌شود. زخم بوجود آمده ممکن است بصورت زخم باز یا بسته باشد.


تروماهای منجر به آسیب سر اکثراً بر اثر تصادفات رانندگی اتفاق می‌افتد.

صدمات سر به ۳ دسته تقسیم می‌شود:-

۱- آسیب به پوست سر

۲- شکستگی جمجمه

۳- صدمات نسوج سر



وجود یا عدم وجود تورم در محل ضربه ربطی به جدی بودن آسیب ندارد.

علایم شایع ترومایی سر:

۱- کاهش هوشیاری بصرت مؤقتی و یا طولانی

۲- خواب آلودگی و گیجی و فراموشی

۳- تهوع و استفراغ

۴- تاری دید

۵- اشکال در تکلم

۶- هم اندازه نبودن مردمک‌های چشم

۷- تحریک پذیری

۸- خونریزی داخل مغزی

۹- خونریزی از پوست سر پاره شده

۱۰- ضعف عضلانی

۱۱- سردرد

۱۲- ضعف عضلانی

علایم هشدار که باید به اورژانس مراجعه نمود:

۱- استفراغ

۲- کاهش هوشیاری

۳- سر گیجه- فراموشی- سردرد-

۴- تشنج

۵- تنگی نفس

۶- تاری دید و ضعف بینایی

۷- ادامه خونریزی یا ترشح خونابه‌ای

عدم تعادل

۸- تنگی نفس و افزایش ضربان قلب و تنفس

درمان

در صورتیکه علائم شدید باشد بیمار بستیری

میگردد و اقدامات تشخیصی و درمانی شامل

آزمایش خون، آزمایش مایع نخاع‌گرایی ساده از جمجمه و گردن، سی‌تی اسکن و MRI

تعیین گستردگی آسیب تنها با معاینه و مشاهده و انجام اقدامات فوق میسر می‌باشد. امکان دارد پس از معاینه و بررسی فرد به منزل فرستاده شود، اما باید یک فرد قابل اطمینان در کنار بیمار باشد و مراقب بروز علایم جدی بیمار خود باشد.

۲۴ ساعت اول پس از ضربه به سر از نظر بروز علائم و عوارض جدی بسیار مهم است. اگرچه ممکن است این علایم دیرتر از حتی تا ۶ ماه پس از آسیب نیز ظاهر شود.

در موقع بستری در بیمارستان اگر شما مراقبت از فرد را به عهده درید وی را تا ۲۴ ساعت، هر ۲ ساعت یا طبق آنچه بشما توصیه شده است بیمارتان را بیدار کنید و اگر بیدار نشد حتماً اطلاع دهید. در صورت بروز علایم زیر هم فوراً اطلاع دهید:

۱- استفراغ

۲- ناتوانی در حرکت دادن دست یا پای یک طرف نسبت به طرف دیگر.

۳- هم اندازه یا هم شکل نبودن مردمک‌ها

۴- سفتی گردن

۵- تشنج

6-بیقراری

7-سردرد شدید

تا زمانیکه آگاهی به زمان و مکان و یا افراد در بیمار وجود ندارد نباید از داروهای مسکن و یا مخدر استفاده نمود .

آموزش های لازم :

1-تا زمان رفع خطر بیمار باید در رختخواب استراحت کند.

2-رژیم غذایی بیمار بستگی به دستور پزشک دارد.

3-هنگام استراحت در منزل بهتر است سر و بدن با سطح افقی 30 درجه باشد.

4-در چند روز اول از دادن غذای سنگین پرهیز شود. جهت جلوگیری از یبوست از سبزیجات و میوه هایی مانند انجیر و آلو استفاده نمایید.

5-داروهای خود را بطور منظم و در ساعت مقرر مصرف نمایید.

6-قبل از اتمام داروها به پزشک معالج خود مراجعه نماید.

7-نسبت به پانسمان جراحت سر در منزل اقدام نماید.


8-از زور زدن خودداری کرده و بهتر است از توالی فرنگی استفاده کنید.



اورژانس بیمارستان با قرآن علوم شهرستان اهر

8-از حمام می توانید استفاده نمایید ولی تا زمانیکه بخیه ها را بکشند بهتر است سرتان خشک باشد.

9-طبق دستور پزشک افیزیوتراپی اندام ها را انجام دهید.



**با آرزوی سلامتی برای شما بیماران
و همراهان محترم**

منبع: بروونر - سودارت

<http://www.tebyan.net>