

بالا رفتن قند خون :

علائم: ۱: تنفس بسیار عمیق و سریع

۲: کاهش سطح هوشیاری

اقدام: هرچه سریعتر به اورژانس مراجعه کنید.

بالا رفتن فشار خون :

اگر فشار خون به طور ناگهانی و به میزان زیاد، بالا رود ← خطر خونریزی مغزی

یا آسیب به مغز ← کاهش سطح هوشیاری

علائم: سردرد-خونریزی از بینی-تاری دید-بالا بودن فشارخون(با دستگاه فشارسنج)-کاهش سطح هوشیاری

اقدام: در صورت تجویز پزشک استفاده از قرص زیر زبانی در حالت نیمه نشسته -مراجعه به اورژانس

پایین افتادن فشار خون :

علت: خونریزی زیاد، کار زیاد، خستگی و عدم مصرف مایعات به مقدار کافی، تعریق شدید، تهوع و استفراغ و اسهال شدید ← کاهش فشار خون در صورت پیشرفت ← شوک

علائم: سبکی سر- تاری دید- ضعف و بیحالی

پایین بودن فشارخون (با دستگاه فشارسنج)

کاهش سطح هوشیاری بدلیل شوک

علل کاهش سطح هوشیاری :

۱: افزایش یا کاهش قند خون (شایع ترین علت)

۲: افزایش یا کاهش فشارخون

۳: شوک

۴: سنکوپ یا غش کردن

۵: ضربه مغزی

۶: حمله مغزی

۷: مرحله بعد از تشنج

۸: سرمازدگی و گرمزدگی

۹: مسمومیت (داروها و سموم)

۱۰: عفونت مغز

۱۱: علل طبی دیگر

پایین افتادن قندخون:


علائم: تاری دید-سردرد-ضعف-لرزش بدن-عرق کردن-طپش قلب-بیهوشی کامل

اولین اقدام:

اگر بیمار بیهوش نیست و قادر به خوردن میباشد باید یک ماده غذایی شیرین در حالت نشسته به وی بخورانید.

کاهش سطح هوشیاری

اورژانس بیمارستان
باقر العلوم
شهرستان اهر





حمله قلبی :

یکی از رگهای خون رساننده به خود عضله قلب بسته شود—حمله قلبی

علائم :

-درد فشارنده قفسه سینه (معمولاً کل قفسه سینه) -
ممکن است به فک پایینی یا یکی از دستها یا بین دو
کتف تیر بکشد.-تهوع-عرق سرد(عرق می کند اما
پوست وی سرد است)- ضعف شدید و تنگی تنفس

*** برای کلیه موارد ذکر شده و دیدن علائم های بیان
شده سریعاً به اورژانس مراجعه نمایید.



علائم : سردرد شدید- کاهش سطح هوشیاری- تنفس نامنظم-هم اندازه نبودن مردمکها یا گشادی شدید مردمکها در فرد بیهوش

سکته مغزی : تعریف: خونرسانی به قسمتی از مغز مختل شود .

سکته مغزی ۲ علت دارد:

۱: پاره شدن رگهای مغزی (سکته مغزی + خونریزی مغزی)

۲: گیرکردن یک لخته در رگهای مغزی

علائم :

ناتوانی در صحبت کردن و قورت دادن آب دهان

کج شدن صورت- ناتوانی در حرکت دادن اندامهای بدن (ممکن است یکطرفه باشد)-سردرد

-بیهوشی به صورت تدریجی یا ناگهانی

-هم اندازه نبودن مردمکها یا گشادی شدید مردمکها در فرد بیهوش

*اگر هوشیار است، او را بخوابانید. زیر سر او یک بالش بگذارید و سر او را به یک سمت خم کنید تا آب دهان وی بیرون بریزد (چون نمیتواند آب دهان را قورت دهد).

-مراجعه به اورژانس

اقدام: بیمار به آرامی روی زمین بخوابد و پاهای او را بالاتر از بدن نگه دارید . -مراجعه به اورژانس

ضربه مغزی :

ضربه به سر— به بافت مغز آسیب بزند و رگهای داخل جمجمه پاره شود — خونریزی داخل مغز و شکستگی استخوانهای جمجمه

نکته مهم :

همیشه فردی که دچار ضربه مغزی شده است را از نظر آسیب نخاع گردنی، آسیب دیده فرض کنید و سر و گردن مصدوم را با دست بیحرکت کنید.

تکان مغزی:

علائم : کاهش سطح هوشیاری موقت که به سرعت بهبود می یابد.

سرگیجه و تهوع-سر درد- فراموشی وقایع حول و حوش حادثه

کوفتگی مغزی: بافت مغز کوفته و فشرده شود.

بیمار بیهوش میشود و نیاز به ارجاع به بیمارستان دارد.

خونریزی مغزی :

علت: ۱ : ضربه ۲ : بالا رفتن شدید فشار خون

۳ : خودبخودی